

Степень тяжести инфекции

1

**ЛЁГКАЯ** ИНФЕКЦИЯ (IDSA<sup>a</sup>)/PEDIS<sup>b2</sup>

**Наличие минимум двух факторов:**

- Местный отек или
- Эритема > 0,5 см
- Боль или болезненность при пальпации
- Местное повышение температуры
- Гнойные выделения

Пероральные препараты



2

**СРЕДНЯЯ** ИНФЕКЦИЯ (IDSA)/  
PEDIS 3/3o остеомиелит

- Местная инфекция с эритемой >2 см **или**
- Вовлечение структур, расположенных глубже чем кожа и подкожно-жировая клетчатка
- Отсутствие признаков системной воспалительной реакции

Пероральные препараты или начальная парентеральная терапия



3

**ТЯЖЕЛАЯ** ИНФЕКЦИЯ (IDSA)/  
PEDIS 4/4 остеомиелит

- Температура >38 °C или <36 °C
- ЧСС >90 ударов/минуту
- Частота дыхания >20 вдохов/минуту или PaCO2 <4.3 кПа (32 мм рт. ст.)
- Количество лейкоцитов в крови >12 000/мм3, или <4 000/мм3, или >10% незрелых (палочкоядерных) форм

Парентеральные препараты



Характеристики

Антибиотики \*

См. рекомендации Руководства по инфекции для выбора эмпирической схемы применения антибиотиков, при инфекции диабетической стопы

Клиническая картина

<sup>a</sup> IDSA: Infectious Disease Society of America

<sup>b</sup> PEDIS: Perfusion, Extent, Depth, Infection and Sensation