

Как провести оценку состояния сосудов у пациента с диабетом и язвами стопы?

1

Пальпация пульса на стопе

Наличие пульса на стопе полностью не исключает ЗПА

- Оценка формы пульсовой волны при доплерографии артерий стопы
- Лодыжечное систолическое давление и лодыжечно-плечевой индекс
- Систолическое пальцевое давление и пальце-плечевой индекс

- Трёхфазные доплеровские волны
- Лодыжечно-плечевой индекс 0.9-1.3
- Пальце-плечевой индекс ≥ 0.75

ЗПА маловероятно

2

Значения не в норме, но нет тяжелой ишемии:
Есть ли инфекция или язва с поражением подкожных структур?

Нет

Независимо от результатов тестов, если язва не заживает в течение 4-6 недель:

Да

Тяжелая ишемия:

- Систолическое давление на лодыжке < 50 мм рт. ст. или
- Лодыжечно-плечевой индекс $< 0,5$ или
- Пальцевое давление < 30 мм рт. ст.

3

КОНСУЛЬТАЦИЯ СОСУДИСТОГО/ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ХИРУРГА, РЕШЕНИЕ ВОПРОСА О РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ



Задняя большеберцовая артерия



Тыльная артерия стопы



Систолическое давление на лодыжке



Систолическое давление на пальцах